

**ANIMADVERSION
ES DE AMAUROSIS
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM...**

Raimondo Gusmerotti



ANIMADVERSIONES
DE AMAUROSIS

Dissertatio Inauguralis

QUAM

CONSENSU ET Auctoritate PRAEPOSITI DIRECTORIS
AC PRAESENTIS FACULTATIS MEDICAE SPECTABILIS DOMINI
DECANI HOC DNI HILARIUSCHOTI D. D. PROFESORIS ET
DOCTORIS MEDICAE LIBERA UNIVERSITATIS MONACENSIS
HONORIS AC PRIVILEGII RITE CONSIDERATIS IN
ATTIGRAMEN AC CELEBRITATE UNIVERSITATIS TULIMEN

REMPER

DOCT. ALOYSIO SCARENZIO

*Pathologiae Generalis acutae Pharmacologiae
Prof. Ord.*

UNA CUM THESISIS DEFENSIONE

Monacii Aprilis 1848

PUBLICAE INQUISITIONI OFFERUNT

RAYMUNDUS GUSMEROTTI

EX BAIORE TIBOLINIS



TICINI 1848

VS. TYPOGRAPHIA FOLL ET REGEL.



Handwritten signature or mark.

Faint handwritten text at the bottom right.



BARTHOLOMÆO MEGGI

VIRO OPTIMO ET AMICISSIMO

HAEC PAUCA DICARAT

Christophorus Anker.

—

Medicinae tirocinum, priusquam vitae civilis
 limina ingreditur, thesauri quicumque ex
 vasto scientiae medicae pecori depromp-
 tos leges academice elaborare jubent, cui ma-
 neri satisfactorum nonnullas animadvertentes
 de amantiori conscripsi principia semper se-
 quens Professoris Rossae.

■

DEFINITIO.

Notabilis videtur imbecillitas aut cecitas, ab affectione retinæ et nervi optici profecta, namque anaxarctosæ, gallicæ serena, catarractæ nigrae insignitur.

Tres anaxarctosæ gradus distinguuntur :

1. Amblyopia enervata, quæ adfecti negotii aspectum quidem habent objectorum, debilem tamen atque confusam.

2. Amblyopia imperfecta, quæ laborantes lucem adhuc distinguunt a tenebris.

3. Amblyopia completa, in qua lucis perceptio deficit, aculique functio penitus extinguitur.

Caecitas, in qua nervus opticus veretur, varia esse potest, ideoque via vitalis differit

8

namque sensibilitas oculi est exaltata; alia in oculis insensata; quandoque passim sub-
lata, quam ab rem tres species enumeramus
occurrant: I. Amaurosis crethica, II. sym-
phoretica seu coepectiva, III. torpida.

I.

AMAUROSIS CRETHICA.

Iste morbus saepe a torribus status ini-
tiis peritum increvit, et in amaurosin cre-
thicam simplicem, et spasticam dividitur.

A. Amaurosin crethicam simplicem.

Hae crethica originem trahit ab oxyopia
neglecta, quae per longius brevioris tem-
poris spatium protracta exordium lucis des-
tituitur, oculum objectis micantibus obvelit,
ab infusa oculum viridibus, deinde coeruleis ac
tandem punctulis nigrescentibus repletum re-
dactum, usque dum amaurosin evadat. Fre-
quenter accedente lucis est illis irritamento
levia conjunctivae et scleroticae rubor, adan-
ta lachryarum secretio, cancrum turgentem
et generalia crethici signa, pariter quidam
et magis sympathici affectus indicantia,
observantur. Rara spes fieri potest cum

anurosis perhibere curandi, maxime et par-
tialis hebetudinem relinquendo, sapientia autem
in torpidum transiendo, contrariae artis
periculum claudenda.

In hac anurosi duobus indicationibus co-
distinguendum est, scilicet sensibilitatem ex-
cipientem aduocari, et debilitatem nervi optici
artem curandi.

Sensibilitatem conspicuam fontationes
aqua et acris peritae, una interius potione
anidolorum, v. g. salla caust. tartar. cum
symplo ribesior. nec non narcotizarum, ut
aquaes laro-cosai, opi, acetal. morphii;
minua vobis correspondent narcotica, conspic-
uam pupillae dilatationem producendo paria.
Temporis successum emulao prodeum truat
preparata nuci, imprimis flores et villas
cinci, tartarus emulicna refracta doai, casto-
reum, chenopodium ambrosioides, flores tiliae,
naphae, aurantiorum, et in eam narcotici-
proflimis solulo citendum erit, fore ut a
torpe vito desistatur, et integre retrogo,
cumphara, china propitetur.

b. *Amnesia epotica.*

Hæc anomala symptomata adscribitur toties et ea facilius evolvitur, quo magis potentia nociva cerebri epithalamici fuerit. Intermitit cordium, videl. spiritum antecedere solet et paroxysmo absolute disparet, eo deinceps in continuum abit. Symptomata ejusmodi amnesicos a norma totius cerebri differunt; alia enim manifestantur in convulsionibus infantum; alia in epilepsiâ; alia in hysteriâ vel hypochondriâ.

c. *Amnesia cerebri infantum.*

Cerebrum aggreditur infantes vagæ, aut prodromum hydrocephali vel comæ, nam symptoma difficile definitionis, nam acie primæ viæ, nam hospitibus in tracta intestinali veribus prementur, nam symptomata variæ causæ exstantes consideranda præbent. In hydrocephalo pupilla est dilata, angularis et immobilis, sclerica in coracæ circuli colore rosæ tingitur, bulbus jam immobilitate, jam motu oscillatorio instruitur, insuper phænomena insensu aut evulsi hydrocephali adant.

In difficili dentitione haec afferunt: exanthema gingivarium, robor colorque guttarum, lacrymatio, lris conjunctivae et sclerae rubor, tumorem oculi turgor, pupilla dilatata et laevae, nec non convulsivae rotationes musculorum oculi. Spectato oris modo ab acida primarum viarum, dolor pressus in regione frontali, — rubor sclerae ex illo-pallidus, — dilatata, irregularitas pupillaeque vagans, — lacrymatio involuntaria, — confusio aut intermittens visus, — consuetio regiae malarum, — dentes videntes, ne tandem sponte intercurrentes viderentur oculorum rotatione consuevit. Praesentia verum in talis obituarii sequentis morbose phenomena offert: males caecitatem, coram marginemque retrospatratum dicendantes, — frequentia lacrymationem, — pupilla dilatata inordinataque, — recurrentia oculi et ipsius faciei musculorum spasmus formati oculi etque angulum ducquentem, — variabilem palorem et faciei turgescitiam, gravellam capitis, cephalicam, aures vastrum, labium ferentem, pruritus rariis, crebra epistaxis, labia superiora auresque interdum turgida, linguam ingrem, secretionem salivae eduo-

otum; praeterea tumores, velleitationes abdominales praecipue in regione umbilicali, vomitus fluidi aquiformis, appetitus non nunquam in faeces lapineas degenerantem, secretum juxta mucosum, juxta singula stercora intermixtum, urinas pallidas subcoerule instructas, audores aevocantes, ventrem tumidulum, hinc inde sonori disturbata tandemque verum expulsiorem.

Prognosis hujus morbi plus minusve incerta a duratione, habitus individuali et complicatione dependet. Difficiter admodum pristinus integritatis status restituitur in casibus ab hydrocephalo provenientes, dum functiones retinae et nervi optici longi tempus recuperandum admittit aneuria, a dentitione difficili, ab acie priusquam viarum et venarum curata, atque ulla complicatione scabiosa.

Tractatio aneurica convulsiva characteri ejus accommodata variat. In hydrocephalo bene conducunt catenae digitali nuptae, decoctum jaceae et canidia spinosae, axynel squillas etc.; frictions externae cum unguento sibilato in vertice et nucha institutae. — Aneuria difficiliter dentitionem posteaquam eruptione dentium tollitur, quam antiphlogistica et emollientia faciliorem red-

43

dant. — Quam acida in primis viis praegravare, catarracta nigra usum repositi absorbentur: magna, vel. lipid. cancer. propian., dein tonica et leniter stimulantia, apipino rhei, calami aromatic., extracti chin. liqura. — Ad secundas aut expellenda vermes propianada erunt filix mas in pulverem redactas vel meliori cum acetosa extractum ipales, acida anton., valeriana, cortex rad. perici gra., stimula granulatum, oleum theeridin., nec non purgatio; simul vero reproductionis processum corrigere et iuvare opus est, ut nihil verum deatruatur, etiamque reparatio procureatur.

§. Anorexia epileptica.

Anorexia epileptica recurrentes eo pergunt, ut oculus debilitatur et sane functioni praesens nequit. Signa characteristica a morbo essentiali demonstrantur; — major lucis quantitas pupillam dilatat, — balli oculi a directione normali non aberrat.

Hae anorexia ad altiorum gradum erecta oculi medius relinquitur, licet morbi naturam conventionalissimum curandi consilium excepit.

7. Anomalia hysterica et hypochondriaca.

Ordo hic affectus acutus comprehensionis experitur, manu quasi super labrum factae, unde mobilitas impeditur, — nec eodemque tempore apertum rictum palpebrarum vel clausum vel apertum tenet, — conjunctiva rubet, pupilla hinc immobilis, hinc iridis anterior contracta cavetur, — ab initio visionis imbecillitas, in posterum ad constantem caecitatem data.

Ante omnia causam excitantem respectus habendus est, ut eadem remoueatur, aut continuam curam actio exerceatur obviandaeque. Idemque quoque tractationem perficiant remedia, characterem specificum comperendo agenda.

B.

IMBECILITAS & CONCRETIOHIBUS

Anomalia sympathetica asperumetro in petra occurrit, in ophthalmicis transire amat, nec immerito apoplexia humerali comparatur, quoniam inopinate irrumpit. Morbus raro infantes necque infestat, frequentius viros

terat quædam ætatem æqualem, ac magis obnoxii sunt constitutione sanguinea et robusta præditi, nec non oculi colorem albaque prædentes. Quandoque utrunque oculum invadit serena semelque evoluta et symptomatibus stipata cæcitas, photophobia, photopsiæ, strabismus et myopia; quandoque subito insuit phosmeria consuetata, hæmorum congestionem encephalon et oculum variis proferens. Hæc indolenter hæc æquo vitari, suppressione sudoris facialis, læsione gulærum acribus illata vaporibus, v. g. sulfuris, ammoniac; compressione, contusione oculique vulneratione; abusu spirituum et vi narcotica pollentium, applicatione visuale intensiori præcipue in objectis micra microscopii ope directis.

Ei annos præbent hæmorum congestionem encephalon veras, insulas, thoracis congestionem, hæmura inclinata capite subitque periculis periculis, pathemata evoluta ut ira, terror; plethora universalis, suppressione evacuationum habitudinem, epistaxes, fluxus hæmorrhoidalis et menstruorum; depletiones sanguinis neglectus, affectiones systematis vniuersi periculis, arthritis, exanthemata retroplexa, ophthalmia etc., quibus causa consideratis plures anaxores congestivæ spe-

eis emergunt, quarum posteriores commemorantur: 1. plethorica; 2. rheumatica; 3. metastica; 4. abdominalis; 5. arthritica; 6. impetiginosa; 7. scrofulosa; 8. syphilitica.

1. *demencia plethorica*

Proficiscitur plethura universa aut topica capitis, modo subito, modo paulatim evolvitur, rationis potentiarum marbilicarum habita, majorem magnamque affertur caput collumque veras advocantem. Ab initio aegri molestiam oculi plenitudinem magnamque conqueruntur photopsiam; nimirum diu objecta iridilorum et lucidioris colore tincta adparent, dum in tenebris corulea aut flavida scintillatio et fulguratio, globi ardentia, clausis quoque palpebris ob oculos veruntur. Associatur dolor tantus, pressus in regione frontali et superocillari et continuo crescens, maculae nigrae, rube aut macula plus minus densa — areola, circa pupillam — ante oculos volitant. Cornua splendet et magis convexa conspicitur, carunculae turgent, papillae contractae et aegritudine obscuratur, sclerotica se conjunctiva in caruncula circumferentia rubet.

Illiciter commemoratis placamentis per-

durantibus, dolor vagari necipit et aestus in rete decussim transformantur, luce obscurum, in tenebris lucidum, rutilans, concolorum objectaque lride circumdant. Quævis oculis congestio anthyoplam adauget, ideoque vicia largas, spiritusana, animi pathemata, et volentia corporis putatis cum pedisequum habent. Cornu largum, canerum apertum hincivatur, pupilla dilatatione et intractabilitate insignis, scleroticum conjunctivamque vasa livida percurrunt et interni oculi humores inquinantur. Amaro ad summum evolutionis gradum elata, cephalica et photopnia decreascent, sensus ponderis frigorisque cum adarcto oculi valentia subintrat, usque varicositates et atrophie bulbi minuantur. Quam amaroris recensoria et in inferiori evolutionis gradu constituta est, nec habita prave humorumque dyscrasia complicata occurrat, non semper annuam reddit, imo atque sponte contrarium amaro evocationibus spontaneis ut illam hæmorrhoidali et menstrua. Inmediabilis vero amaroris habenda est, per vasa decussim longioris rotationem oculorum argenteis paulum sciuntur. Amarois, diutioris vias intellectusque contras subequata, prodromas maxime considerari potest.

In amara et plethorica principalis indicatio vasorum turgentium depletionem petit, ut suppressa et impedita nervi optici acio expediat ac in integrum restitatur. Potissimum itaque remedium in detractione sanguinis universali situm est; utpoteque vero universalis virium status plethoriciora videt, escorbaticae eructus vel hirsutius applicandae erunt, et quidem in suppressa epistacti circa pinam nasalem; silentibus recensitis in parte interna tymphanum, in haemorrhoidum suppressione circa anum. Insistat angustiorum vasorum depletionem, ad hirsutius congestionem evacuatio per alvum, purgantibus anaphlogisticis aut clysteribus adjuvantibus praedicta, plurimum coarctat. Saepo adjuvante semicupa et polidivis tepida, ac ceteris remedia, actionem systematicam vasorum debilitando haemorrhagiae organum compensando paria, opportune adhibeantur.

Ad promovendam amarae sensationem congruo animi vitae regularis opus est; hinc inde quolibet capite congestionem praecavere oportet, hoc sensibilitatis oculorum gradus atemperetur, air sit purus, siccus, vitae austera, digesta laetitia, nutrimenta vegetabilia animalibus praeposita, potus refrigerantes; mentis autemque insitutio fortiter

asistetur, et maximum sanitatis emolumentum praestabit ambulatio in locis viridibus, praeis etc. Scapo reprensente balneola frigida oculorum et dentata, coarctatio angustae cinctae in regione suprasternali, et interne calones ad stans humorum reversionem indicantur.

§. *Amarae rheumatis*

Capitulum affectione vagante nervi optici atque inde impedita oculi fractione, corpore cisis in subjectis ad rheumaticas dispositis vel de laborantibus, praecipue quando facies calida vel ardore modico aut frigida gelidiusque oblectibus expantur. Huc spectat quoque anarctica species, a repentina diuturni catarrhi suppressione orta, alio refrigerium et totius corporis vel solius faciei, abluendo cum aqua gelida aut hanc uerbis attrahenda. Nonnunquam epidemica et endemica manifestatur sub forma neptelopsiae vel leucralopsiae, quae compellatur etiam nocturna, dysopsia interdu-rum, amblyopsia crepuscularis, periodice recurrent, quae egredi diurno tantum tempore laes frangitur, crepusculum vixit catarrhi res oblectum coarctat, nocturni coarctat.

que vicia oriantur, qui ventri redeunte die iterum restituantur.

Generatim laboriosa aggreditur persona, temperaturæ vicissitudinibus exposita, ideoque agricola, miles in castris, viros pro secula sequari, ætatis mediam præ infirmitatibus vestibusque incedit. Hemerologie favent vir et saturnalæ, ubi mare ac vapores sunt humido-frigida cæstet. Nervallæ terra est endemicæ, et moribus Italæ, Hispaniarum, insulis Melæ, Chinæ, et præsertim regionibus paludosis.

Symptomata autem variæ, præter oculi nervi optici, vel alius rami tertii et quinti, vel ipsæ organa cerebri magis sympathici instructa afficiuntur.

In simplici affectione nervi optici præter insensum vel parum sublatum visum, phosphenia oculi nocturnæ et colorum papillæ nigrescentem non alia phænomena morbosæ observantur. Verum tertio et quinto pari in compressionem tractis, affectis morbosæ diffusitæ super periclitum, musculos ciliariis tertii instructis et elevatorem palpebræ superioris; præsertim in membrana bulbi serosa ac fibrosa, speciatim conjunctivam et iridem; aggreditur quoque glandulam larynalem atque thymicam; hinc

in oculos prodeunt symptomata sequenda: dolor lacrimans, vagus, modo in bulbo, modo in orbita, modo in partibus vicinis sedem figens, nunc super regionem frontalem atque temporalem ad nunc usque, nunc super genas ad nathum inferiorum diffusus, quilibet temperaturae vicissitudine exasperatus, et nonnunquam sculpulis brachiisque irradiatus; uno eodemque tempore major sanguinis copia oculos verum afficit, intolerantia locis angustis et quilibet stimulis levissimis lacrymarum secretionem promouit. Cornea obscuratur empendet, canthi turgescunt, pupilla centroscopia parte dilatationem inter et contractionem quasi immobilis versatur, directio bulbi plerumque externa, ideoque ab initio nuda et uno oculo affecto diplopia observatur, nec non paralytica elevatio palpebrae superioris.

In catarbis supposito acri sensum oppressione in radice nasi et regione frontali conpescuntur, qui in dolorem circa tempora et verticem dirisissimum transire solent. Nares et oculus emicantur, vasa conjunctivae ac scleroticae propriis in angula turgent, pupilla immobilis et dilata verum tempore dirigitur, visusque maxime transigens est. Hinc ad altioris evolutionis gradum evecta,

dolor pressus ad radicem nasi et alae frontales restringitur, confusio mentis et pulveris sensus in naso frequentes producit stertitationem, pupilla coarctatur, et coloris pallido-nigri et immobilis redditur. Illic referenda sunt: stasis palpebrae superioris et lachrysa nec non scintilla.

Arteriosi rheumatismi cum affectione nervi sympathici conjuncta praeter symptomata commemorata apparet: horripilationes cum calore circumscripto, lassitudo, aestus, capitis gravedo, aurium sensus, morroia, alia alba, lingua nuda alba abducta, respiratio difficilis, transitorii dolores in lateri pectoris pungentes, tumores, sensus pleuritici ac opprobrii in scrobiculo cordis, urticae, abdomen tumidum, frequens mictus necessitas, alba stipata, ardor transitorius, pulsus calor, parvus, durus etc.

Hae amarorosa est intermittens, a refrigerio et perturbata digestione organorum imperio sympathici nervi obditumum oriunda, insipida hepatica, et nequaquam cum ankyra confundenda, quae a pupilla parva aut tempore retine nascitur, quo in non lachrysa clava licet tempore nimis distincta, nec aliam agnoscat causam quam lacrimarum lachrymam.

Exitas aneuroses rheumaticae differunt. Faventibus igitur morientis, tantum cautionis eventum sperare licet, cum aneurosis recens orta et in inferiori evolutionis gradu constituta est, alias in raris tantum aegris cura optata curiosior effecta et a residuis talibus accers, lras pediseque interitus cataracta habetur. Aegro diathesi arthritica laborante, aneurosis rheumatica in arthriticam alire committit. Quodsi neque aneurosis a suppresso cataracta ortum neglexerit, alias frontales dilatantur ut oculus coarctatur, inde bulbus protrudit cum ceteris infra et extra constituta, quo facto dolor periodicus increment, metamorphosis subit et quavis laci perceptio evanescit. Nephelopia niplarivm post paucos dies, hebdomadas et menses, quin oculis solibentur, dissipatur et rarissime in aneurosin continuam mutari solet.

In aneurosi rheumatica, quam angustis vasis vel ophthalmica vel opthalmica obstruat producti, methodum antiphlogisticam petat, ut suppressa et impedita nervi optici actio libera reddatur ac in integram restitatur; itaque depletis sanguinis universalis et topici, causticis cum nitro, aut decoctum graminis cum liquore terreae foliae tartari, et

alve stipata purgare et hysterem repauescunt. Symptomatibus regimine antiphlogistico mitigatis remedia lenientia et sudorifica, deinde anodyna in catambis cum anacardio, aut cum camomilla aut camphora, aut tartarus sibiatus deui reducta opportune adhibentur; externe vesicantia retro aurea vel nucham, aut unguentum sibiatum et aculeis in auxilium vocari solent. Nonnulli summis humilibus exsulant vapores costae hepatis bovinas, illasque apparet in costis directas. Si nati fracta, asperitatem tamen functione recte imperfecta vixque parum emendato, et doctibus licet transitoria in regione frontali residua, insignis levamen afferunt maiores camphorae doses, anthraci asimonialis, pulvis Placenti aut Doveri, extractum acuti, gajacum, petroleum rectificatum ad guttas quatuor vel liborio, ac type intermittente praecipue hemicrania china cum calamo aromatico, et topica frictio cum unguento cinereo opio rapto, his tanque de die in regione suprathoracica facienda. Dolore frontali evadente et in bulbo concentrato linimentum volatile, vesicantia retro aurea vel nucham ad oculos etiam usque virtutem tribuant.

Principes ratio habenda est exteriori sup-

pressi, in quo linctis membranis mucosae resistunt, et stases sinuum frontalem conficiuntur oportet, ad quos lincta assequenda methodis antiphlogisticis bene conducti. Insuper membranas macipare vaporibus demulcentis aequè tepidis vel infusi specierum, vel decocti musciglacis, uti muscosi conciliatæ gr. decem. sol. in lactis calidi unc. quatuor et coct., infundibuli ope naribus adtrahis.

Si similitatem mucus mucosus excipitur, et quoquequo pressio in radice nasali increment, cephalalgia tamen immittitur, emat-linctis separantur et ad struxitioria confugiendum erit, quibus sunt: acetabulas pulverisatum, sales vel quarta parte calomel. solutas, partes aequales interur. viri, pulv. rad. valerian. et sacchar. albi, quae remedia excipiant pulv. rad. angel. vel bellidori nigri, vapor spiritus ammoniacalis, opportuna distantia in aere direction. Ad virtutem certis cunctis proficiet infundentes cum spiritu musph., volentia in regionem frontali et temporali, ac aere internam remedium alterationem. Anger inquamque virtutem et mucus viridescens consurgere cogitur, pressio mediana in radice nasali et vaporesitatis potestatem eruat, aere haeretur et se-

rima ocyas pristina vires claritas restituitur. Hinc autem fluere, pertinaciter recanente, bulboque protrudente, auxilio artis sinus frontales operiendi sunt, quo neglecto bulbus parit vastaque caries vitam minuitur.

3. *Amaurosis nervosa.*

Hæcæ excitant abusa substantiarum principio amaro pallentium, vel collas surraptam e radice ciccorii radicibus et convulsis amaricantes; opium, stramonium, belladonna, præparata saturata, vina et remedia plumbæ adhibenda. Aegrotantes omnino plumbiculis oculi ingratum adveniunt et majorum tantum objectorum distinctiorem habent; simul tuncq. vasorum conjunctivæ et scleroticae, immobilitas pupillæ dilatata ac in oculis, nec non artuum tremor manifestantur, quibus symptomatibus perdurantibus eccellis perfecta sequitur. Pupilla verens angulos magis dilatatur, sclerotica passim rubra, huc et illuc oculis vasis interiecta, palpebrae in individuis debentis supillorūque florum turgescunt, paralyia palpebræ superioris et bulbi motus puto minus clarescunt observantur; præditant quoque convulsiones extrinsecum et musculorum duri, ac ali-

male contra lucem sublevis sensus externi et interni, prae aliis audibus et memoria debilitantur.

Amorosis, praeparatis naturae inductis, saepe saepius colles naturales, illos et contractile maxime pedumque complectitur.

Bonafideis reintegrandae opem largitur absentia dispositionis ad plethoram, congestiones encephalon totius ac oculos, alii sty-pose, et modis originais, autem ad absum belledonae et plumbi systema nervosum nondum penetraverit; contra anasthi-dillia est, adspirationem oculi et vericostitas relinquuntur.

Signis majoris humorum ad caput congestione, detractionem sanguinis universalem et localem praestitendam esse vident; interne oculum circum et anticum, sectioni amplexualem, larynx nervosum una frequenter desideratum fuerit auxilium, adhibitis etiam anodynis. Evoluzione anasthi-rosae sublevis congestioneis phaenomenis adhaere perducit, methodi rationem hinc oportet, infeli torpore correspondente.

4. *Insanum obducit*

Proficiscitur ex affectione viscerum abdominalium plus minus infectorum, valde obvia in subjectis vitam sedentariam agentibus parumque sub Forti ambulantes, et cum lentiori post moram se acies evolvitur. Orientem anacrostem ophthalmia, vasa malarum, hemiopia, vasa interrupta indicant; apparent objecta involuta nebula, ab initio per nigram alternans diem nigra, dein grisea. Sub hi acies a directione normali aberrat; alioquin colorem ex illo rubrum, coeruleum autem vel griseum in cornet circuitu assumit, vasa scleroticæ in angustam parte expanduntur, pupilla dilatata et tæta, si motum dicit, modo huc, modo illic angularia receditur, morbo perfecte evoluta non amplius ad normam rediunt.

Praeter dicta symptomata distinguuntur: cephalica quasi continua, omnia oculorum et facultatum intellectuum adactionem adimere, macrositas, lassitudo, color faciei florissimus, labia violacea, respirium difficile, anorexia, sensus appetentis in ventriculo, tensio inguinum, dolores recurrentes in hypochondriis ad scapulas usque irradiati,

velis turbata et parum in copia, tunc alia clausa, tunc diarrhoea, tunc molimina haemorrhoidalia aucta.

In curando hoc morbo non resolutionem gradatam et congruas vias regiminis obstruktionem viscerum abdominalium, quod fieri potest, auferantur. Si in decursu morbi phlogosum phlogosum praedictum, hirsutius non applicandas, emollientis et leniter solventis erant praeparanda e. g. decoctionem gram. et prun. microrum etc., condpantur quoque cataplasmata partibus affectis applicata et clystera; calidius, ad primam usque alleviationem signa peracta, deinde purgantia et aquae universales maxima cum utilitate administrantur. Dissolutis coagulationis signis remedia lenico-solventia et aperientia indicantur: ut turaxone, chloretum, saponaria, lacta pro circumstantiis cum sale Ulsteri, arena duplicata, manniara, arena. rhea, ita ut aliquot alii evacuationes promoveant. Eadem scopo bene interserviant balnea tepida, clystera solventia et unguenta emollientia regioni abdominali affectui applicanda; quae remedia per plures hebdomadas continuanda, et diarrhoea exorta suspendenda variant et in doctus moribus refoventur. Vieta et digesta foelia, vinum parvum, aqua mineral-

huc vitatur oculus, ambulae aere aperta,
creant animi pathematibus et visus adscri-
ptione. Amblyopia relicta, ad sui sensationem
remedia, in amara terpida indicata, re-
pescuntur.

B. Anomala gressu

Evolutior in delicatella, debilibus, infelix
irascibilis, in feminis oculis anorexia pre-
dicta, quae larga mensium tributa solvere
et in acria diasterecia verentur, ad ar-
chidura dispositae vel eadem rursus affe-
ctae. Causae occasionales sunt: diutina ag-
gritudo, plures frequens, comae parvae
aut acrioris peritetheta, continua oculorum
adscriptio legendo ope ludo artificiali vel
visum in objecta mirata dirigendo, visus
dignus difficilis, deficientis motus in aere
libero, diutina longa in cubiculis humidis
obscurisque. Haecque anorexiae characteres
conducunt in vasa conjunctivas et sclero-
ticae ad varicositatem inclinata, mirari con-
tine splendore, magis convexas et tempora
verum anorexiae, acutus lilla obscuris,
violaceis, huc et illuc nodula corubescen-
tibus ductis, pupilla jam initio inerti, deinde
irascibili, plerumque ad singularem latus

tracta, angusta; bulbo in parte posteriori
extensus ac durus; in sensu keraticationis,
inapetente humido-frigida, repentina tem-
peraturae vicissitudo victu indigesto et
animi pathematis in debetis lachryan-
tion vigintiue digressione. Visio per in-
tervalle nebulae grisea et nigra, nec non
chrysa perturbatur, stimulis in viis vici-
lis agentibus excutitur, quia caecitas, iri-
dis ac choroidae varicositas, et adapha-
cosis humoris vitrei atque crystallini impe-
diti sunt. Lento cum passu morbus pro-
cedit, et prius in oculo sinistro evadit so-
let, alterum progressu temporis invadens.
Si curatio accurata opportuna tracta-
men opposita fuerit, levamen haberi po-
test, et uno oculo affecto eo salutandum
est, fore ut evolutio in altero propedi-
cat.

Hic morbus anurosi chlorici affinis
cum hoc diacriticus potest, Ideoque
abstractionibus et congestione renali natu-
ratica procedent, atque residuos mali pro-
peditas fustici in brachio applicabatur.

6. Anurosi ab ophthalmia supposita.

Saepe ab herpete exulescente, oculis retro-
pulsis, ulceribus inveteratis praepositiore con-
solidata, scabietibus repressis amarae ma-
scitur, in qua praecipue sibi vindicant at-
tentionem vasa turgentia conjunctivae et
scleroticae, dilatatio magna pupillae quasi
immobilis, et angustiae; oculi tui, repen-
tineque decrementum est subitis visibilibus fa-
cultatis improbiae, quin dolores capitis pro-
cesserint. Anurosi imperfecti, miscela her-
maria vitrei nondum alterata neque vasa ve-
treosae praedilectibus progrederi minus inle-
cta est. In cura eo adhibendum est, ut
exanthemata retro-pulsis et impetiginosa pro-
positiore exulescentiae vel insitionis artificiali, vel
remediis intense irritantibus, cum immediate
applicitis, revocentur, v. g. thiolera in-
guentis sulfuris retenta in extremitatibus,
balacia cum hepate sulfuris adhibita; non
interius florum sulf. napturum sulf. aur. an-
timoni et camphorae, quibus medicamentis
in eadem praecipue agnitionibus insignis bene-
ficia offerri solent.

Anurosi a praepositiore tunc cureatione
curata, capillis chronis vestitus capitis parti

capillatas applicare. Illarumque medicorum
subtiliter conveniet, commendatis sicut in-
terne antimoniatica, mercuriallaque, prae
alia aethiops nativ. et pulveribus Placarii;
oleo camphorae, jacea, aceto, bardana,
dulcamara, guajaco etc.

Utrius habitudo pedum exacerata reme-
dia scribes, emollientibus resurgenda sunt,
ut dispensanda et vesicantibus, balneis sub-
calidis et laeva committis, fusticulis in-
stillas; non interne roborantium nec ulla
applicatione mediciorum locali in auxilium
vocas, quae in oculi emacrescente insupergi-
antur specie novam vim exant.

T. Lacerum spiritibus.

Nequaquam truces ab laeo morbo la-
santes, incidunt, habitu minuerit acriditas
et atrophia meum affecti nec observatio-
nes domant, videntur potius in oculis in
uno oculo plerumque distincti; manifestantur
myopia, nephropia, astigmatropia, amor
quies et adflectio, tristitia, morositas,
compunctio, quandoque praesens molestia in
orbis fundo, quasi bulbus protrudere cog-
tur; intolerantia lucis; lacrymarum secretio
augetur, palpebrae spasmodice contrahuntur,

papilla sensim dilatatur, cunctis inertia, ac angustitate, subsensitur adiphenesia viridescens, corpusque ciliare transparet.

Ni ab hactenus medicamentis antiscrofulosis adhibeantur, facili negotio caecitas, atrophia vel oculi fungus medullaris aspectu extollant.

B. *haemorea epithelica.*

Evolvi amat in rachidicis aut atrophosis, hoc vitæ affectis, utraque oculum invade-
dit sequentibusque stipatur symptomatibus :
Aegroti res omnes diversimode mutatas et
confusas videre incipiunt, vertigines et sco-
tomia conspiciuntur, tinger vasorum, photo-
phobia, palpebrarum, bulbi iridisque convul-
siones cum papilla et oculorum ex obliqua
in sensum prodeunt, quæ phænomena ce-
phalica intermittens, perfecta caecitas cum
visuum oculi varicositate exoritur, dato
doloribus eductis gustus, auditus, odoratus
et memoria erantur, halitus acedens fe-
bris paroxysmi orbem derelinquit, ac vite
morte convulsiva coniungitur.

Neuroscopia tali morbo excruciatum ex-
stans, hypertensiis et carum oculorum cru-
di manifestat.

Incipientem schismode affectionem joga-

huc poterit largissime mercenarium sua, speculatus cura ad mentem Lavrier vel Raut instituta aut interea sublimi administratione.

III.

ENLARGED TORPID.

In hac anæsthesia specie nervi optici acie debilitate torpidæ in exhibitis simulæ rægradi facultati juncta est, transitum in oculorum mechanice format et eriguntur trahit vel a neglecta summa æsthetica aut congestiva, vel congrua opus tractantur; nunquam primario in individuo apparet, quoniam oculi jam ab invincibili debilitate, et lesione senectute, potentie hypostemæ nullum morbi que indicem præcedunt: e. g. majori luce intensitate in oculum sensibilis irritata, adstriatione colorum facti, pressione nervi optici tumore orbitali, constitutione torpida propter vitam indolentem, morum in ambiente insulubri, potius humorum nobilium et alia hujus generis.

Infans evolutio nunc lenta, nunc rapida, nunc repentina apoplexias similia observant. Quodam decursu lentum absolvens desti-

nam fuerit, haecce emergunt phaenomena : objectorum perceptio minus clara et versicoloris, res candidae splendore privantur, color albus in cinereum vel coeruleo-virescentem abit, viridis vel coeruleus brunescit aut nigrescit, una eodem tempore myopiaeque alterantur cum visu reticulari substat. Oculis parvae lucis quantitati insensibiles, aegri saepe nephelopium accipiunt, flammam candorem huiusque vaporem rubrum et iridiformem circumdatum conspiciunt. Potentes excitantes facultatem videndi paulisper emendant, quam ob rem splendor solis meridiani, cereae lentae, spirituosae, siccum rubicundae, medicis corporis tutas, consortis amicorum etc. viam acrius, qui circumstantiis opposita in pejus ruit. Desunt irritatio oculi partiumque vicinarum, cephalaea, sensus plenitudinis ac tensionis; imo torpor, motus palpebrarum laevi utriusque senectutis, axis oculorum a directione normali detecta, secretio lacrymarum glandularumque Mollendorffii laevitatis, cornea plana, opticus communis minus, pupilla generaliter immobilis, angulosa, dilatata, quandoque restricta, oculi pendulae in parte observantur. Si anacrosis affectionem cerebri occupavit, pupilla dilataur, immobilis ac irregularis eva-

dit; in amaurosi, medullae spinalis affectus sequela, pupilla dilabatur, utroque autem casu concomitantur paralytica anasclerorum pars quinti, prolapsus palpebrae superioris, distractio bulbi versus angulum externum, anisotropia, — oculis aperta diplopia, — vel paralytica contractura bulbi muscularum, prolapsus ipsius ac cecitas.

In amaurosi recentior aetate, cecitate adhuc imperfecta, ac castigatione individui robusta, aliqua spes sanitatis restituendae ardebit, quae tanto magis anisotropia haereditaria et accidentibus potentiae cerebro-stimulantibus immiscetur.

Therapia iudicia auctori a tartaro stibato ad venientem ter quaterve cindens, dein decoctum granula cum tartari emetici granula duplex ad usum per tres aut quatuor hebdomadas propinetur, quibus elapsa repetatur, ne vires digestione nimis infringantur.

Inter remedia interna, quae in auxilium felici cum successu vocari solent, antiparalytica enumerari merentur:

4. *Aranea*; infusum aut decoctum illius araneae ad drachmas duas — uncias semis ad colaturam libras unam; pulvis ad 10-20 grana; extractum ad 4-5 gr. in massam piluleam reductum, intra symbolum con-

38

mentibus. Efficaciam ipsius denotant: ardor ventriculi et scrobiculi cordis, erumpi, nausea, vertigo, sensus fermentationis in orbita interna, sudor plus minusve continuatus in regione frontali temporalique, ac ipsae convulsiones corporis electricae, quibus phaenomenis locomotionibus ab ejus usu desistitur et series hac praeparationis dosi minori praescribitur, ceptum tartaro emetico refracta dosi, camphor. valerian. gumi ammoniac, spir. scellae cervi. Acales optima inservit in debilitate systematis cerebellaris ac medullaris, in proclivitate ad paralysem musculorum vel paralyse jam exstante.

2. China, ejus infusum vino frigido perretum, — minus correspondit nullis chinensis, deestque aut chins in substantia, quae forma organa digestioni inservientia valetat. — Principalem locum ubi videtur in affectione sympathici magni et in debilitati corespondere inde exstat.

3. Sublimatus in forma pillulari:

℞. Sublimat. corros. grana duo
solvs in a. q.

Aq. destillatae
sido

Extracti liquir. scrupulum

m. f. l. a massa, e qua form.
pillulae N. 42.

Dandi quatuor pilulas post prandium sumi jabet, experientia autem meliorem extendit effectum, si vespere capiatur; singulis diebus duas pilulas adduntur, usque tam dose sublimati ad 4 - 5 $\frac{1}{2}$ gr. ascenderit.

Ad mentem Dandi cura intra 27 dierum spatium terminatur, etiam per re nata doses sublimati modificantur.

Hanc remedium speciatim commendandum venit in emaciatione torpida, cui opthalmia vel encephalia chronicis causis deducit, ubi nervi optici ac retinae nutritionem organiceam cui orbitae tumores, bulbum prementes, supponere licet; verum contra-indicatur in congestione organa vasa nobiliora, in dispositione ad tuberc. et hæmorrhagias, nec non in gestantibus, quo in casu calorem solus vel saltem curato sustinendi aptus substituitur.

Mora interposita hæc alienum erit, ubi ductiones purgantibus promoveri.

Mixturæ correspondent pulsatilla nigricans, helleborus niger, phosphorus, et risus scorodendron a Doctore Weller laudatum; cum eorum actio est incerta ac detrimenta evitari possunt, pulsatilla et helleboro hæmorrhagiam, phosphoro gastritidem et risus tensionem generando paribus.

Inter remedia localia, contra emacrociam profusa, existant:

1. Naphtha et alia aetherea, ut oleum rosmarini, menthae, thymi, feniculi, caput.

2. Remedia paresthesiaca, uti spiritus cornu cervi, sicuti animale Dippelii.

3. Remedia potenter attenuantia: tinctura cantharidum, phosphorus aethere vitrioli solutus. Nonnullae guttae horum medicamentorum regioni oculi bis de die instillandae veniunt.

4. Spiritus salis saturatus causticus, cujus 3-10 guttae vasa manus directa oculis admoveantur, vaporque ipso admittitur; ter quaterve de die repetendum continuandumque est, donec sensibilitas gradus moderatis, rubor oculi et lachrymarum fluxus fere prodeant.

5. Farinacea et caustica: emplastrum cantharidum vel tartari stibii; graviore vero in casu etiam cuticula parietale et actuale imprimis nasa, regioni superciliarii, temporali aut mastoidea et epierisio, capilla abscisio, applicanda indicantur.

6. Emdermatica; canaliculi cuius caput, nam regionem dictarum epidermide spoliare lique colligere substantiam irritantem, v. g. quatuor grani partem strychninae.

7. Remedia impressionem cum impetu quo-

dum coarctantia, ut introitus aquae claudatur.

Embrocatio diversimode instituitur.

Jinglas canalicula vitrea utitur, longitudinem trium pedum et crassiciem tubuli barometri referens, cujus extremitas superior uncias, sex pollices longe et aperta reperitur; extremitas inferior duas pollices longe ac incurvata in oculum alit. Pars larga superior in calice aqua repleto et opportuna posito piscatur, aqua aer ab extremitate inferiori reperitur, ut rivulus aquae prodeat, cui seger oculum submitit plus minus distans, prout major vel minor actio desideratur.

Hunc apparatus superius machina embrocatoria a Seiffaba examinata et in ophthalmologia Boerli depicta — Vienne et Lipsiae 1800 —, aut parvi casus nomini in clauso institute atque a divitibus applicari licet.

Quanto majori altitudine aqua frigida cadat, eo magis ejus efficacia augebit, attamen cavendum est, ne oculum ab initio totam remedi vim experiat, quae ratione habita per aliquot dies fomenta frigida applicentur, quae deinceps embrocatio excipiat, astringendo bis de die per quatuordecim hanc duratura.

Electricitas functiones vitae animalis et

vegetativae, ut systema vasculare incitat, unde oculi sensibilitas prius ceteris exaltatur, ad quem finem suscipiendam optime inservit balneum electricum, bis die visibus de die per 3-10, velus 15-20 minuta applicatum.

Præter hæc omnia aliata auxilia ad promovendam anaræosam sanitatem ubique conveniens simul vitæ regimen necessarium est. Lux sit moderata, aer purus siquisque, victus exoptus, parvus vias ut curesis uti motus corporis non negligatur, mentis æquique incitatio fortiter sollicite evitetur.

Quam rationalis cura nihil proficiat, empirica medendi ratione mire conveniet, quam eo modo absolvitur, ut a paucis medicamentis jam aliterum diversa quidem, sed talia tamen medicamenta, quibus pertinaciter anaræosis accipius vincit fertur, adhibeantur atque ad exoptos effectus attendatur. Tali itaque tempore a solis juvenilibus et neceatibus utriusque indicantibus deincepsantur.

FINIS.

THESES DEFENDENDAE.

1. Ficus lacunata a vino profusa, a vino refrenatur.
2. In ipso ventriculo et intestinis phlogos purgata nilum habenda.
3. Magnolia amara, et acido valdeper locuta.
4. Medicina vesicae stillica recte curam difficilissimam plus quam alia solentem operatur.
5. Typhus in juvenibus ab intermissione frequentissima.
6. Quod sanitatem expulsi alium et solitudinem sequitur.
7. Omnia systemata in medicina occurrere

